

Божко Наталія  
"22" лютого 2018



**ПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКАЦІЇ РТ.УА.1.2.2016**  
**ВИПРОБУВАННЯ КУКУРУДЗИ (ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ)**  
**ЗВІТ З ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЇ –**  
**РАУНД 2 ЛЮТИЙ 2018 (УКР)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Звіт підготував: | Володимир Новіков  |
| Дата:            | 22.02.2018   |
| Контакти:        | <a href="mailto:vovan.novikov@gmail.com">vovan.novikov@gmail.com</a> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Звіт затвердив: | Наталія Божко  |
| Дата:           | 22.02.2018   |
| Контакти:       | <a href="mailto:smetrology@gmail.com">smetrology@gmail.com</a> |
| Статус:         | Остаточний, Перевидання 2                                      |

Київ-2018

Сторінка 1 з 32.

ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС». Звіт з перевірки кваліфікації. РТ.УА.1.2.2016. Раунд 2 Лютий 2018(УКР)

# **1. ЗМІСТ**

|  |    |
|--|----|
| 1. ЗМІСТ .....   | 2  |
| 2. РЕЗЮМЕ .....  | 4  |
| 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЇ .....  | 4  |
| 3.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ .....   | 4  |
| 3.2. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКУ, ГОМОГЕНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ .....  | 4  |
| 3.3. ВІДПРАВКА ТА ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ .....  | 5  |
| 3.4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ .....   | 5  |
| 3.5. ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОNUВАННЯ УЧАСНИКІВ .....   | 5  |
| 4. ОЦІНКА ГОМОГЕННОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ .....   | 6  |
| 6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ ЛАБОРАТОРІЙ .....  | 10 |
| 7. Z-ІНДЕКСИ .....   | 11 |
| 8. ГРАФІКИ РОЗПОДІЛІВ Z-ІНДЕСІВ ТА ГРАФІКИ РЕЗУЛЬТАТІВ .....   | 12 |
| 8.1. EN 16378:2013 Биті зерна, % .....   | 12 |
| 8.2. EN 16378:2013 Зернова домішка, % .....  | 13 |
| 8.3. EN 16378:2013 Сміттєва домішка, % .....   | 14 |
| 8.4. ISO 6540:1980 Вміст вологи, % .....   | 15 |
| 8.5. ISO 20483:2013 Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.25) ..... | 16 |
| 8.6. ISO 2171:2007 Вміст золи, % (в перерахунку на суху речовину) .....  | 17 |
| 8.7. ISO 6492:1999 Вміст жиру, % (при фактичній волозі) .....  | 18 |
| 8.8. ISO 6865:2000 Вміст сирої клітковини, % (при фактичній волозі) .....  | 19 |
| 8.9. USDA( Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Биті зерна, % .....  | 20 |
| 8.10. USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Сміттєва домішка, % .....  | 21 |
| 8.11. USDA (Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Ушкоджені зерна, % .....  | 22 |
| 8.12. USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 1 - General Information July 30, 2013) Натура, lbu/bu .....   | 23 |
| 8.13. ГОСТ 10840-64 Натура, г/л .....  | 24 |
| 8.14. ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 Сміттєва домішка, % .....   | 25 |
| 8.15. ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 Зернова домішка, % .....  | 26 |
| 8.16. ГОСТ 13586.5-93 Вологість, % .....   | 27 |
| 8.17. ДСТУ 7169:2010 Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.0) ..... | 28 |
| 8.18. ГОСТ 13496.15-97 Масова частка сирого жиру, % (в перерахунку на суху речовину) .....   | 29 |
| 8.19. ГОСТ 13496.2-91 Масова частка сирої клітковини, % (в перерахунку на суху речовину) .....   | 30 |

Сторінка2з32.

ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС». Звіт з перевірки кваліфікації. РТ.UA.1.2.2016. Раунд 2 Лютий 2018(УКР)

|  |    |
|--|----|
| 9. ЗАЗНАЧЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛЮВАННЯ ЗОЛИ(ДОВІДКОВО)..... | 31 |
| 10. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....                            | 32 |

## **2. РЕЗЮМЕ**

2.1. Метою перевірки кваліфікації в випробуванні пшениці є визначення характеристик функціонування (як наведено в ISO\IEC 17043[1]) та підвищення достовірності результатів випробувань.

2.2. Дані перевірка кваліфікації включає використання міжлабораторних порівнянь для підтвердження здатності лабораторій проводити випробування та/або ідентифікації напрямків покращення діяльності.

2.3. Цей звіт з перевірки кваліфікації РТ.UA.1.2.2016 Раунд 2, що відбувся в лютому 2018 є перевиданням 1 остаточного звіту. Звіт складений згідно вимог ISO\IEC 17043 [1] та Програми РТ.UA.1.2.2016 Раунд 2. Звіт оформленний двома мовами – українською та англійською. Англійська версія цього звіту має розглядатися як основна. Обидві версії звіту можуть бути знайдені в мережі Інтернет за адресою <http://www.metrologyservice.com.ua>

2.4. 18 учасника відзвітували про результати випробування зразків згідно цього раунду. Їх результати представлені в подальших розділах.

2.5. Перелік технічних експертів та/або підрядників цього раунду можуть бути надані Учаснику за вимогою.

2.6. Будь-які обчислення, формули, первинні та проміжні дані, що використані в даному раунді можуть бути надані Учаснику за вимогою, за виключенням конфіденційної інформації щодо інших учасників та інформації, що містить комерційну таємницю.

2.7. Дане перевидання складене із-за технічної помилки Провайдера та врахування ряду результатів Учасника №5, як Учасника №4.

## **3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЇ**

### **3.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ**

3.1.1. Функціонуюча система якості ТОВ «Метролоджі сервіс» (далі – Провайдера) відповідає вимогам ISO\IEC 17043:2010[1] та охоплює весь процес перевірки кваліфікації (далі – ПК) для всіх перевірок кваліфікації.

### **3.2. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКУ, ГОМОГЕННІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ**

3.2.1. Провайдер використовував валідовану процедуру та відповідних технічних експертів і підрядників для відбору, виготовлення, гомогенізації та розділення зразків, що відповідають вимогам Програми перевірки кваліфікації РТ.UA.1.2.2016 Раунд 2. Детальна інформація щодо приготування зразку та гомогенізації не публікується в даному звіті, але може бути надана Учаснику за вимогою. Випробування, що необхідні для доведення (верифікації) гомогенності та стабільності зразків виконуються компетентними підрядними лабораторіями у відповідності до [2-8]. Дані результати з статистичною обробкою публікуються в звіті.

3.2.2. Учасники можуть зв'язуватись з Провайдером для запиту детальної інформації щодо відбору, виготовлення, гомогенізації та розділення зразків, для тих зразків, по яким вони приймали участь. Така інформація може бути надана Учаснику виключно з дотриманням вимог конфіденційності Учасником та якщо дана інформація не може

компрометувати інших Учасників та/або поставити під загрозу виконання вимог конфіденційності щодо інших Учасників та/або є комерційною таємницею.

### **3.3. ВІДПРАВКА ТА ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ**

3.3.1. Зразки для випробування – **кукурудза (*Zea mays*)** були відправлені 29.01.2018 згідно графіку проведення Програми перевірки кваліфікації РТ.UA.1.2.2016 Раунд 2.

3.3.2. Кожен виготовлений та ідентифікований зразок був герметично упакований у поліетиленовий пакет.

3.3.3. Всього 18 участника з 2 країн отримали по одному зразку кожен. 18 участників відзвітували про результати випробування зразків.

### **3.4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ**

3.4.1. Якщо Учасник хоче поради/консультації з приводу функціонування/власних результатів, він має зв'язатися з Провайдером. Провайдер може звернутися (за згодою Учасника) до технічного експерта або до підрядної лабораторії з питаннями Учасника.

3.4.2. Зразки, що залишилась після закінчення раунду, є доступними для продажу, як сертифікований референтний матеріал(CRM) з сертифікатом якості та невизначеністю. За детальною інформацією звертайтеся до Провайдера.

### **3.5.ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ**

#### **ХАРАКТЕРИСТИК**

#### **ФУНКЦІОНУВАННЯ**

3.5.1. Провайдер виражав результати Учасників у вигляді традиційних z-індексів відповідно до [1].

3.5.2. Приписане значення для кожного показника було розраховане як робастне середнє значення результатів випробувань з використанням методу Хьюбера H15 [2,3]

3.5.3. Цільове стандартне відхилення (Стандартне відхилення для оцінки кваліфікації, характеристики функціонування) кожного показника обирається або згідно характеристичного рівняння Гурвіца, стандартного відхилення міжлабораторних експериментів, що наведені в методі, стандартного відхилення попередніх раундів перевірок кваліфікації, або стандартного відхилення результатів (робастного стандартного відхилення після вилучення викидів). Вибір робився, опираючись на сучасну практику розрахунків, що застосовується для міжлабораторних експериментів та схем перевірки кваліфікації.

3.5.4. z-індекси визнані задовільними, якщо  $|z| \leq 2$ . z-індекси визнані сумнівними, якщо  $2 < |z| \leq 3$ (позначено жовтим в таблицях). Якщо  $|z| \geq 3$ , результати розглядаються як незадовільні(позначені червоним в таблицях). Розрахунки були зроблені згідно [1,3,5].

3.5.5. Деякі Учасники зазначали температуру спалювання золи по ISO 2171:2007. Дано інформація наведена довідково в розділі 9. Беручи до уваги результати даного раунду, провайдер може зауважити, що в рамках цільового стандартного відхилення, температура спалювання (500°C -900°C) не вносить суттевого вкладу в результат вимірювання за цим методом.

3.5.6. Провайдер не оцінював результати по ГОСТ 10845-98 Вміст крохмалю, % (в перерахунку на суху речовину) та по ISO 6493:2000 Вміст крохмалю, % (при фактичній

волозі) із-за недостатньої кількості результатів від Учасників. Дані результати приведені в Розділі 6 довідково.

3.5.7. Учасник №18 вказав ГОСТ 26226-95 Вміст золи, % (в перерахунку на суху речовину) замість ISO 2171:2007. Даний результат не був оцінений Провайдером.

3.5.8. В даному раунді 1.93% всіх результатів визнані незадовільними. В раунді 1 незадовільних результатів не було.

#### 4. ОЦІНКА ГОМОГЕННОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ

4.1. Зразки оцінювалися на гомогенність та стабільність після змішування та пакування шляхом відбирання десяти зразків матеріалу випадковим чином з усіх приготованих. Шість з цих зразків були випробувані двічі за умов повторюваності, оскільки тільки 40 зразків було виготовлено згідно[7]. Чотири зразки для випробувань стабільності зберігались у відповідних умовах в період підготовки та звітування по цьому раунду. Вони також були випробувані двічі.

4.2. Статистичний аналіз отриманих даних про гомогенність та стабільність проводився з використанням критерію Кохрена ‘С’ та тесту аналітичної дисперсії(analytical variance test) для ‘достатньої гомогенності’(‘sufficient homogeneity’) згідно [3.4].

4.3. Достатня гомогенність була підтверджена по кожному показнику згідно Програми у виготовлених зразках, окрім показників, що можуть розглядатися як еквівалентні або гомогенність може бути припущенна з гомогенності інших показників.

#### 4.4 ISO 6540:1980 Вміст водоги, %

| Source of $\sigma_p$ value to use |   |            |
|-----------------------------------|---|------------|
| Use(write '1')                    | Source  | $\sigma_p$ |
|                                   | C>13.8%, HORWITZ  | 0,3802     |
| 1                                 | 120ppb<C<13.8%, HORWITZ                                     | 0,3867     |
|                                   | C<120 ppb   | 3,179770   |
|                                   | MASS NEGATIVE POWER FOR HORWITZ EQUATION(%=2, ppb=9, ppm=6) | 2          |
|                                   | SD  | 4,2700     |
|                                   | Trial SD  | 3,9800     |
|                                   |   |            |
|                                   |   |            |
|                                   |   |            |
|                                   | Target SD chosen  | 0,3867     |
|                                   | $\sigma^2_{all}$  | 0,013462   |
|                                   | Replicates  | 10         |
|                                   | F1  | 1,88       |
|                                   | F2  | 1,01       |
|                                   | Critical value  | 0,0268     |
|                                   | Between sample variance S <sup>2</sup> sam                  | 0,0014     |
|                                   | Sufficient homogeneity test                                 | PASS       |

#### 4.5. Дані для всіх показників

| Метод | EN 16378:2013    | EN 16378:2013       | EN 16378:2013               | ISO 6540:1983       | ISO 20483:2013   | ISO 2171:2007  | ISO 6492:1999  | ISO 6865:2000  | ГОСТ 10840-64    | ГОСТ 13586.5-93     |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|------------------|---------------------|
|       | Broken grains, % | Grain impurities, % | Miscellaneous impurities, % | Moisture content, % | Crude protein content, % (Expressed as a mass fraction of dry product) | Ash yield, % (Expressed as a mass fraction of dry product) | Fat content, % (Expressed as a mass fraction of the product as received) | Crude fibre content, % (Expressed as a mass fraction of the product as received) | Test weight, g/l | Moisture content, % |

#### Гомогенність та стабільність

##### С-тест "Кохрана"

|                                  |        |        |        |         |        |        |        |        |          |         |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| Critical value(5%,10pairs)=0,602 | 0,6069 | 0,5032 | 0,2900 | 0,5848  | 0,3772 | 0,3144 | 0,3147 | 0,4740 | 0,3556   | 0,5100  |
| Mean Result                      | 2,8190 | 1,3570 | 1,2405 | 14,4535 | 8,4055 | 1,2319 | 3,2415 | 1,9410 | 726,3500 | 14,2420 |
| Conclusion(Висновок)             | PASS   | PASS   | PASS   | PASS    | PASS   | PASS   | PASS   | PASS   | PASS     | PASS    |

#### Analytical variance test(тест аналітичної дисперсії)

|                       |          |              |          |         |           |         |         |           |          |         |
|-----------------------|----------|--------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|---------|
| S <sup>2</sup> anal   | 0,0297   | 0,1811       | 0,0083   | 0,0014  | 0,0144    | 0,0000  | 0,0027  | 0,0077    | 2,2500   | 0,0025  |
| Sanal                 | 0,1722   | 0,4256       | 0,0914   | 0,0380  | 0,1201    | 0,0065  | 0,0518  | 0,0877    | 1,5000   | 0,0501  |
| S <sup>2</sup> sample | 0,0277   | 0,2547       | 0,0235   | 0,0014  | 0,0000    | 0,0001  | 0,0028  | 0,0029    | 2,2111   | 0,0008  |
| $\sigma_p$            | 0,2460   | 0,9300       | 0,3360   | 0,3867  | 0,1400    | 0,0477  | 0,1086  | 0,1800    | 3,1340   | 0,3819  |
| $\sigma_p$ source     | Trial SD | Method Tr SD | Trial SD | Horwitz | Method Tr | Horwitz | Horwitz | Method Tr | Trial SD | Horwitz |
| $\sigma^2$ all        | 0,0054   | 0,0778       | 0,0102   | 0,0135  | 0,0018    | 0,0002  | 0,0011  | 0,0029    | 0,8840   | 0,0131  |
| Critical value        | 0,0402   | 0,3293       | 0,0275   | 0,0268  | 0,0179    | 0,0004  | 0,0047  | 0,0132    | 3,9344   | 0,0272  |
| Conclusion(Висновок)  | PASS     | PASS         | PASS     | PASS    | PASS      | PASS    | PASS    | PASS      | PASS     | PASS    |

## 5. ЗВЕДЕНІ ДАНІ

| Метод   | EN 16378:2013 | EN 16378:2013      | EN 16378:2013       | ISO 6540:1980   | ISO 20483:2013  | ISO 2171:2007  | ISO 6492:1999                          | ISO 6865:2000                                      | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 1 - General Information July 30, 2013) | ГОСТ 10840-64 | ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 | ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 | ГОСТ 13586.5-93 | ДСТУ 7169:2010  | ГОСТ 13496.15-97  | ГОСТ 13496.2-91  |       |
|---|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|---|--|-------|
|   | Біті зерна, % | Зернова домішка, % | Сміттєва домішка, % | Вміст вологи, % | Вміст золі, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку відношення азоту на сирий протеїн – 6,25) | Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку відношення азоту на сирий протеїн – 6,25) | Вміст жиру, % (при фактичній вологізі) | Вміст сирої клітковини, % (при фактичній вологізі) | Біті зерна, %   | Сміттєва домішка, %   | Ушкоджені зерна, %  | Натура, г/л   | Сміттєва домішка, %          | Зернова домішка, %           | Вологість, %    | Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку відношення азоту на сирий протеїн – 6,0) | Масова частка сирого жиру, % (в перерахунку на суху речовину) | Масова частка сирої клітковини, % (в перерахунку на суху речовину) |       |
| К-ть результатів                              | 12            | 12                 | 12                  | 12              | 10  | 11   | 9                                      | 10   | 8   | 8   | 8   | 8             | 13                           | 14                           | 14              | 16  | 10  | 9  | 8     |
| Кількість  z >3                               | 0             | 0                  | 0                   | 0               | 1   | 0  | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0             | 1                            | 1                            | 0               | 0   | 1   | 0  |       |
| Кількість  z >3, %                            | 0,000         | 0,000              | 0,000               | 0,000           | 10,000  | 0,000  | 0,000                                  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000         | 7,143                        | 7,143                        | 0,000           | 0,000   | 11,111  | 0,000  |       |
| Середнє                                       | 2,913         | 0,953              | 1,358               | 14,281          | 8,226   | 1,246  | 3,418                                  | 1,865  | 3,180   | 0,929   | 2,843   | 57,511        | 724,692                      | 1,731                        | 4,339           | 13,877  | 7,986   | 3,927  | 1,938 |
| Min   | 2,580         | 0,460              | 0,850               | 13,930          | 7,020   | 0,887  | 3,220                                  | 1,380  | 3,100   | 0,700   | 2,230   | 55,900        | 720,000                      | 1,090                        | 3,030           | 13,300  | 7,860   | 3,750  | 1,400 |
| Max   | 3,220         | 1,670              | 1,880               | 14,570          | 8,420   | 1,370  | 3,660                                  | 2,230  | 3,390   | 1,090   | 4,160   | 59,400        | 732,000                      | 4,100                        | 9,710           | 14,130  | 8,300   | 4,290  | 2,350 |
| SD(Стандартне відхилення)                     | 0,246         | 0,339              | 0,339               | 0,163           | 0,426   | 0,132  | 0,146                                  | 0,251  | 0,090   | 0,111   | 0,759   | 1,510         | 3,660                        | 0,761                        | 1,720           | 0,292   | 0,124   | 0,160  | 0,315 |
| Median(Медіана)                               | 2,830         | 0,890              | 1,415               | 14,310          | 8,360   | 1,270  | 3,380                                  | 1,820  | 3,150   | 0,940   | 2,430   | 57,595        | 724,000                      | 1,585                        | 3,840           | 14,025  | 7,955   | 3,860  | 2,000 |
| Robust mean(Робастне середнє)                 | 2,913         | 0,930              | 1,356               | 14,292          | 8,367   | 1,289  | 3,437                                  | 1,807  | 3,158   | 0,940   | 2,800   | 57,511        | 724,111                      | 1,630                        | 3,994           | 13,919  | 7,979   | 3,864  | 1,933 |
| Robust SD(Робастне SD)                        | 0,246         | 0,279              | 0,336               | 0,108           | 0,062   | 0,064  | 0,138                                  | 0,210  | 0,040   | 0,063   | 0,682   | 1,510         | 3,134                        | 0,375                        | 0,666           | 0,217   | 0,068   | 0,101  | 0,288 |
| SD з методу(з мікелаб. експ.)                 | 0,740         | 0,930              | 0,850               | N/A             | 0,140   | 0,033  | 0,199                                  | 0,180  | N/A   | N/A   | N/A   | N/A           | 0,300                        | 1,000                        | 0,700           | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |
| SD з рівняння Гурвіца                         | 0,099         | 0,038              | 0,052               | 0,378           | 0,243   | 0,050  | 0,114                                  | 0,066  | 0,106   | 0,038   | 0,096   | N/A           | N/A                          | 0,061                        | 0,130           | 0,375   | 0,233   | 0,126  | 0,070 |
| Цільове SD(відхилення перевірки кваліфікації) | 0,246         | 0,930              | 0,336               | 0,378           | 0,140   | 0,050  | 0,114                                  | 0,180  | 0,106   | 0,090   | 0,976   | 1,387         | 3,134                        | 0,300                        | 1,000           | 0,375   | 0,233   | 0,125  | 0,288 |
| Джерело цільового SD                          | Trial SD      | Method Tr St       | Trial SD            | Horwitz         | Method Tr St  | Horwitz  | Horwitz                                | Method Tr St                                       | Trial SD  | Trial SD  | Trial SD  | Trial SD      | Trial SD                     | Method Tr St                 | Method Tr St    | Horwitz   | Horwitz   | Trial SD   |       |



## 6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ ЛАБОРАТОРІЙ

|                   | EN 16378:2013 | EN 16378:2013      | EN 16378:2013       | ISO 6540:1980    | ISO 20483:2013   | ISO 2171:2007   | ISO 6492:1999                        | ISO 6865:2000                                    | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) | USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 1 - General Information) | ГОСТ 10840-64 | ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 | ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 | ГОСТ 13586.5-93 | ДСТУ 7169:2010  | ГОСТ 13496.15-97  | ГОСТ 13496.2-91  |      |      |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|---|--|------|------|
| Метод             | Біті зерна, % | Зернова домішка, % | Сміттєва домішка, % | Вміст вологої, % | Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.25) | Вміст золи, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.25) | Вміст жиру, % (при фактичній волоzi) | Вміст сирої клітковини, % (при фактичній волоzi) | Біті зерна, %   | Сміттєва домішка, %   | Ушкоджені зерна, %  | Натура, г/л   | Сміттєва домішка, %          | Зернова домішка, %           | Вологость, %    | Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.0) | Масова частка сирого жиру, % (в перерахунку на суху речовину) | Масова частка сирої клітковини, % (в перерахунку на суху речовину) |      |      |
| Номер лабораторії | 1             | 2,68               | 1,67                | 1,35             | 14,25  | 8,40  | 1,23                                 | 3,22   | 2,02  | 3,15  | 1,09  | 3,76          | 56,49                        | 727,00                       | 1,35            | 5,92  | 14,05   | 8,05   | 3,75 | 2,35 |
| 2                 | 2,74          | 0,98               | 0,93                | 14,09            |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              | 732,00                       | 1,09            | 3,33  | 13,80   |  |      |      |
| 3                 | 3,10          | 0,68               | 1,67                | 14,32            | 8,37   | 1,33  | 3,60                                 | 1,74   |   |   |   |               |                              |                              | 1,90            | 3,86  | 14,00   |  |      |      |
| 4                 |               |                    |                     |                  |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              | 723,00                       | 1,24            | 4,10  | 13,50   |  |      |      |
| 5                 | 3,16          | 0,70               | 1,60                | 14,34            | 8,35   | 1,32  |                                      |  |   |   |   |               |                              | 723,00                       | 1,86            | 3,82  | 14,10   | 7,94   |      |      |
| 6                 | 3,22          | 0,66               | 1,60                | 14,30            |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              | 724,00                       | 1,78            | 3,82  | 14,10   |  |      |      |
| 7                 | 2,80          | 0,46               | 1,48                | 14,57            | 8,25   | 1,26  | 3,66                                 | 1,82   | 3,39  | 0,92  | 4,16  | 59,40         | 724,00                       | 1,86                         | 3,10            | 14,13   | 7,92  | 3,98   | 2,11 |      |
| 8                 | 2,73          | 0,80               | 0,87                | 13,93            |  |   |                                      |  |   | 3,15  | 0,88  | 2,30          | 58,80                        | 720,00                       | 2,07            | 3,65  | 14,10   |  |      |      |
| 9                 | 2,67          | 1,22               | 1,88                | 14,40            | 8,33   | 1,37  | 3,38                                 | 1,74   | 3,10  | 0,97  | 2,23  | 58,70         |                              |                              |                 |   |   |  |      |      |
| 10                | 2,86          | 1,20               | 1,59                | 14,37            | 8,39   | 1,33  | 3,44                                 | 1,70   | 3,16  | 0,93  | 2,26  | 58,70         |                              |                              |                 |   |   |  |      |      |
| 11                | 2,58          | 1,28               | 0,85                | 14,20            | 8,34   | 1,30  | 3,48                                 | 1,82   | 3,13  | 0,70  | 3,17  | 56,10         | 722,00                       | 1,39                         | 4,28            | 13,70   | 7,97  | 3,81   | 1,91 |      |
| 12                | 3,20          | 0,97               | 1,22                | 14,38            | 8,39   | 1,25  | 3,36                                 | 2,10   | 3,15  | 0,95  | 2,42  | 55,90         | 721,00                       | 1,91                         | 4,00            | 14,10   | 8,00  | 3,84   | 1,62 |      |
| 13                | 3,21          | 0,81               | 1,25                | 14,22            | 8,42   | 1,16  | 3,37                                 | 1,38   | 3,21  | 0,99  | 2,44  | 56,00         | 721,00                       | 1,38                         | 4,87            | 14,10   | 8,00  | 3,96   | 1,40 |      |
| 14                |               |                    |                     |                  |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              | 730,00                       | 1,20            | 3,26  | 13,30   | 7,86   | 3,86 | 2,20 |
| 15                |               |                    |                     |                  |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              | 727,00                       | 4,10            | 9,71  | 13,30   | 8,30   | 3,85 | 1,82 |
| 16                |               |                    |                     |                  |  |   | 1,27                                 |  | 2,10  |   |   |               |                              |                              |                 |   | 14,05   | 7,88   | 4,29 |      |
| 17                |               |                    |                     |                  |  |   |                                      |  |   |   |   |               |                              |                              |                 |   | 14,00   | 7,94   | 4,00 | 2,09 |
| 18                |               |                    |                     |                  |  |   | 7,02                                 | 0,89   | 3,25  | 2,23  |   |               |                              | 727,00                       | 1,11            | 3,03  | 13,70   |  |      |      |



## 7. Z-ІНДЕКСИ

## 8. ГРАФІКИ РОЗПОДІЛІВ Z-ІНДЕСІВ ТА ГРАФІКИ РЕЗУЛЬТАТІВ.



### 8.1. EN 16378:2013 Биті зерна, %





## 8.2. EN 16378:2013 Зернова домішка, %




### 8.3. EN 16378:2013 Сміттєва домішка, %



#### 8.4. ISO 6540:1980 Вміст вологи, %





## 8.5. ISO 20483:2013 Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.25)





## 8.6. ISO 2171:2007 Вміст золи, % (в перерахунку на суху речовину)





## 8.7. ISO 6492:1999 Вміст жиру, % (при фактичній волозі)





## 8.8. ISO 6865:2000 Вміст сирої клітковини, % (при фактичній волозі)



## 8.9. USDA( Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Биті зерна, %




## 8.10. USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Сміттєва домішка, %




## 8.11. USDA (Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017)



Ушкоджені зерна, %





USDA (Grain Grading Procedures, Chapter 4 - Corn April 11, 2017) Ушкоджені зерна, %





## 8.12. USDA(Grain Grading Procedures, Chapter 1 - General Information July 30, 2013) Натура, lbu/bu





## 8.13. ГОСТ 10840-64 Натура, г/л





## 8.14. ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 Сміттєва домішка, %




## 8.15. ГОСТ 30483-97/ДСТУ 4525:2006 Зернова домішка, %





## 8.16. ГОСТ 13586.5-93 Вологість, %





**8.17. ДСТУ 7169:2010 Вміст сирого протеїну, % (в перерахунку на суху речовину, коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн – 6.0)**



## 8.18. ГОСТ 13496.15-97 Масова частка сирого жиру, % (в перерахунку на суху речовину)



## 8.19. ГОСТ 13496.2-91 Масова частка сирої клітковини, % (в перерахунку на суху речовину)



## **9. ЗАЗНАЧЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛЮВАННЯ ЗОЛИ(ДОВІДКОВО)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Номер лабораторії |  |
| 1                 | При визначенні вмісту золи за методом ISO 2171 наважка зразка спалювалась при температурі 900 °C |
| 2                 |  |
| 3                 |  |
| 4                 |  |
| 5                 | Температура спалювання золи 550°C  |
| 6                 |  |
| 7                 | t = 550C   |
| 8                 | t = 550C   |
| 9                 | Ash yield - 550 ± 10 °C  |
| 10                | Ash was determined at temperature 550 oC   |
| 11                | Температура при визначення золи в муфельній печі 900°C   |
| 12                | Температура спалювання золи - 500°C  |
| 13                | Вміст золи при -T 550*C  |
| 14                |  |
| 15                |  |
| 16                | температура спалювання для золи - 550°C  |
| 17                |  |
| 18                |  |

## **10. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

1. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing
2. Analytical Methods Committee, Robust Statistics – How not to reject outliers Part 1. Basic Concepts, Analyst, 1989, 114, 1693-1697
3. FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME (FAPAS). Protocol for the organization and analysis of data, sixth edition, 2002.
4. Fearn, T. and Thompson, M, A new test for ‘sufficient homogeneity’, Analyst, 2001, 126, 1414-1417
5. ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
6. ISO Guide 35:2006 Reference materials -- General and statistical principles for certification
7. ILAC Discussion Paper on Homogeneity and Stability Testing, April 2008.
8. ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers